# FARMACROM NASAL

(Ácido cromoglícico)

**COMPOSICIÓN**.- Cada 100 ml contienen 2 g de ácido cromoglícico en forma de sal sódica.
Excipientes: cloruro de benzalconio, polisorbato 80, edetato disódico y agua purificada.

**FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE**.- Solución nasal, envase con 15 ml.

**ACTIVIDAD**.- FARMACROM NASAL es un antialérgico tópico nasal.

**TITULAR - FABRICANTE**
ALCON CUSÍ, S.A.
c/ Camil Fabra, 58
08320 El Masnou - Barcelona.

**INDICACIONES**.- Prevención y alivio de los síntomas que acompañan a rinitis alérgicas, rinitis estacionales y fiebre del heno.

**CONTRAINDICACIONES**.- Pacientes con alergia conocida a cualquiera de los componentes de esta especialidad. No utilizar en menores de seis años.

**PRECAUCIONES**.- No exceder la dosis recomendada en la Posología.
En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.
El uso del nebulizador por más de una persona puede dar lugar a contagios.

**INTERACCIONES**.- No se han descrito, pero debe consultar al médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento si está en tratamiento con otros medicamentos.

**INCOMPATIBILIDADES**.- No se han descrito. FARMACROM NASAL puede utilizarse al mismo tiempo que otros medicamentos antihistamínicos y/o descongestivos nasales.

**ADVERTENCIAS.-** Los pacientes asmáticos o con enfermedades cardíacas, renales, hepáticas o con pólipos nasales deben consultar con el médico antes de utilizar este medicamento.

**Embarazo y lactancia**
Su posible utilización por las mujeres durante estos períodos será valorada y establecida por el médico.
**Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria**
No se han descrito
**Uso en niños:** Consultar al médico.

**POSOLOGÍA**.- Adultos: La posología habitual es de 3 a 4 nebulizaciones al día en cada fosa nasal. En caso necesario se puede llegar hasta un máximo de 6 nebulizaciones diarias.
Deberá mantenerse una dosificación regular y continuada con el fin de conseguir una protección eficaz y sostenida en las rinitis.

**INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO**
**Antes de la primera aplicación:**

Retirar el capuchón de protección.

Accionar el pulsador las veces necesarias para que se llene el mecanismo de la válvula y pueda producirse una nebulización correcta.




**MODO DE EMPLEO:**

Sonarse bien la nariz antes de utilizar este medicamento.

Inclinar un poco la cabeza hacia adelante e introducir el difusor en una fosa nasal tapando la otra con el dedo.

Inspirar y presionar enérgicamente sobre el fondo del frasco.

Respirar por la boca y repetir la misma operación en la otra fosa nasal.

Después de su utilización limpiar bien el difusor con un paño limpio y húmedo y colocar de nuevo el capuchón de protección.
Cada persona debe utilizar su propio envase para evitar contagios.

**SOBREDOSIS**.- Debido a las características de este preparado, destinado a uso tópico, no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso de la especialidad a las dosis recomendadas ni en caso de ingestión accidental del contenido de un envase.
En caso de sobredosis o de ingestión accidental, acudir a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

**REACCIONES ADVERSAS**.- En algunos casos puede dar lugar a aumento de estornudos, escozor o irritación local que suelen desaparece en los primeros días del tratamiento. Otros efectos adversos que pueden aparecer, aunque con poca frecuencia, son: reacciones alérgicas (tos, dificultad para tragar, dificultad para respirar o pitidos, picor, hinchazón de cara, labios o párpados), náuseas, dolor de cabeza, eczema cutáneo, broncoespasmo, sequedad de la mucosa nasal y hemorragia nasal.

Si observa estas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

**CONSERVACIÓN**.- Proteger de la luz.

**CADUCIDAD**.- Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**TEXTO REVISADO.-** Enero 1997

ALCON CUSÍ, S.A.
c/ Camil Fabra, 58
08320 El Masnou - Barcelona